

Dernières attentions avant la récolte

La récolte des olives approche à grands pas près du littoral. Il faut en tenir compte avant de procéder aux éventuels traitements contre la mouche et la maladie de l'œil de paon.

Les dernières pluies ont peut-être lessivé les barrières minérales protégeant vos oliviers de la mouche de l'olive. La question de la pertinence d'un renouvellement se pose, car la récolte approche.

Si vous comptez gauffer vos oliviers vers la fin octobre ou début novembre, une nouvelle application ne se justifie pas, d'autant que la baisse des températures risque de réduire l'activité du ravageur. En outre, le respect du délai avant récolte peut être remis en cause dans le cas d'une récolte précoce. Il est également inutile d'effectuer un traitement à base de Decis J, le seul insecticide homologué contre la mouche de l'olive en gamme jardin.

Si la récolte est prévue au-delà du 20 novembre, le renouvellement de la barrière minérale doit être envisagé. Le traitement



Dans les secteurs à influence littorale au plan climatique, les olives ont commencé à tourner. Un phénomène qui ne concerne pas que les fruits piqués par la mouche. L'heure de la récolte approche.

phytosanitaire adjuvant (Decis J) peut également être réalisé si vous observez encore beaucoup de captures de mouches sur vos pièges et si vous n'avez pas encore procédé à trois applications (nombre maximal de traitements au Decis J par an). L'Association française interprofessionnelle de l'olive (AFIDOL) invite cependant les oléiculteurs à prendre des précautions pour protéger les abeilles à l'occasion de ce traitement. Tout simplement parce que les pluies d'automne entraînent le fleurissement de plusieurs plantes herbacées qui attirent les butineuses.

Vous devez donc tonde l'herbe de votre oliveraie. Cette opération aura également pour effet de préparer le terrain en vue de la pose des filets de récolte. Une fine épaisseur d'herbe est à rechercher. Profitez-en pour nettoyer les souches de leurs rejets, toujours

en vue de faciliter la pose des filets.

Enfin, n'oubliez pas de vérifier l'apparence des feuilles de vos oliviers, sur lesquelles apparaissent les premières taches dues à la maladie de l'œil de paon. Si vous n'avez toujours pas traité avec un produit à base de cuivre, il faut le faire au plus vite, en particulier si vous notez plus de 10 % de feuilles tachées.

Si vos arbres étaient protégés, il y a de fortes chances que la dernière application ait été lessivée par les pluies. C'est le cas si le cumul a atteint 40 mm, ce qui implique un nouveau traitement à demi-dose (une nouvelle fois, attention au délai avant récolte). Au-dessous de 40 mm de précipitations, vous pouvez vous abstenir.

Barrières minérales et trituration

L'AFIDOL souligne que "la présence de traces d'argile blanche calcinée sur les fruits ne doit pas poser de difficultés particulières aux mouliniers. La trituration des olives et les caractéristiques de l'huile obtenue sont identiques dans tous les essais réalisés depuis plusieurs années". Et d'ajouter : "En olive de table, les traces disparaissent au nettoyage des fruits et ne constituent pas non plus un obstacle".